



COPROCULTIVO

Aplicable para los siguientes exámenes: **Coprocultivo, Cultivo Campylobacter, Cultivo Vibrio, Cultivo de Yersinia**

(I-005)

Estimado/a paciente:

Su médico le ha indicado un examen que requiere de una **muestra de deposición para el cultivo solicitado**. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones terapéuticas apropiadas a su condición. **En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio le entregarán un envoltorio con un tubo que contiene gel y una tórula con algodón en uno de sus extremos.**

No abra el envoltorio hasta el momento de tomar la muestra.

El examen requiere de una muestra de buena calidad, por lo que debe leer las siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.

Requisitos:

- Se sugiere no estar en terapia con antibióticos ni consumiendo laxantes.

Recolección de la muestra:

- Abra el envoltorio y retire la tórula de algodón tomándola desde el extremo de la tapa.
- Introduzca la punta con algodón en el tracto rectal unos **6 cm en caso de adultos y 3 cm en niños menores de 10 años**, gírela unas 3 a 4 veces y retire.
- En lactantes y niños que aún usan pañal, **tome la muestra con la tórula directamente del pañal** de la zona que presente mucosidad, sangre o se encuentre más disgregada.
- Luego destape el tubo que viene en el set e **introduzca completamente la tórula de manera que el algodón quede adentro del gel**.
- Presione el extremo de la tórula para que el tubo quede herméticamente cerrado.

Traslado de la muestra:

- Una vez tomada la muestra, lleve el tubo dentro de una bolsa plástica a la Unidad de Toma de Muestras antes de que pasen 12 horas desde su obtención.
- Mantenga la muestra a temperatura ambiente. **NO REFRIGERE.**